

# Atracurium 25<sup>®</sup> - Atracurium 50<sup>®</sup>

## Atracurium bésylate

### FORMES ET PRESENTATIONS :

Solutions injectables dans des flacons de 2,5 ml et de 5 ml – Boîtes de 10 et de 50 flacons.

### COMPOSITION PAR FLACON :

	Atracurium 25 <sup>®</sup>	Atracurium 50 <sup>®</sup>
Atracurium bésylate	25 mg	50 mg
Excipients :	acide benzène sulfonique ..... q.s	
E.P.P.I. q.s.p	2.5 ml	5 ml

### PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES :

L'Atracurium est un curare, non dépolarisant.

### INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

Atracurium 25<sup>®</sup> et Atracurium 50<sup>®</sup> sont utilisés pour relâcher les muscles au cours de la plupart des anesthésies générales en chirurgie, et pour permettre une ventilation artificielle en service de réanimation.

### CONTRE INDICATIONS :

Atracurium 25<sup>®</sup> et Atracurium 50<sup>®</sup> sont contre indiqués dans les situations suivantes : antécédent d'allergie à l'Atracurium.

### MISE EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI :

#### Mises en garde spéciales :

Atracurium 25<sup>®</sup> et Atracurium 50<sup>®</sup> ne doivent être administrés que par des anesthésistes ou des praticiens familiarisés avec l'utilisation et l'action des curares, ou sous leur contrôle. Du matériel d'intubation trachéale, d'assistance respiratoire et d'oxygénation artérielle adéquat doit être disponible.

Comme avec tous les curares, la surveillance des fonctions neuromusculaires lors de l'utilisation de l'atracurium est recommandée afin d'ajuster individuellement les besoins.

#### Précautions d'emploi :

Utiliser Atracurium 25<sup>®</sup> et Atracurium 50<sup>®</sup> avec précautions en cas de :

- myasthénie (tendance excessive à la fatigue musculaire, progressive ou évoluant par poussée) ou autres maladies neuromusculaires, ou d'anomalies électrolytiques, (anomalie de l'eau et des sels minéraux du sang),
- insuffisance cardiovasculaire,
- personnes asthmatiques ou atopiques (sujet aux allergies),
- antécédent connu d'allergie à un autre curare.

#### Grossesse et allaitement :

L'atracurium ne passe pas par la barrière foetoplacentaire. Il peut être utilisé au cours de l'anesthésie de la femme enceinte.

L'atracurium ne passe pas dans le lait maternel. Il peut être utilisé au cours de l'anesthésie de la femme allaitante.

#### Conducteurs et utilisateurs de machines :

La conduite d'automobile et l'utilisation de machine sont déconseillées pendant au moins 24 heures qui suivent la complète disparition de l'action curarisante de l'Atracurium.

#### EFFETS INDESIRABLES :

Comme tout produit actif, ce médicament peut, chez certaines personnes entraîner des effets plus ou moins gênants :

- réactions allergiques graves,
- rougeurs et éruptions cutanées, baisse de la pression artérielle, ou, exceptionnellement bronchospasme (gêne respiratoire), voir réaction anaphylactoïde.
- crises convulsives : exceptionnelle en cas d'utilisation prolongée en milieu de réanimation chez des malades insuffisants rénaux.
- après une utilisation prolongée de myorelaxants chez des patients hospitalisés en Unités de soins intensifs, des cas de faiblesse musculaire et ou de myopathies ont été signalés.

### POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION :

#### Posologie :

La dose d'Atracurium est calculée en fonction du poids du patient et de l'intensité, du mode et de la durée de la curarisation recherchée et doit être ajustée en fonction de la surveillance neurologique et musculaire (monitorage neuromusculaire).

#### Mode d'administration :

Atracurium 25<sup>®</sup> et Atracurium 50<sup>®</sup> sont administrés par voie intraveineuse en injection unique ou en perfusion.

#### Conduite à tenir en cas de surdosage :

Signes et symptômes :

Les principaux signes de surdosage sont une paralysie musculaire prolongée et ses conséquences.

#### Traitement :

Il est essentiel de maintenir la ventilation pulmonaire artificielle jusqu'à l'obtention d'une respiration spontanée adéquate. La sédation totale est nécessaire, puisque la vigilance n'est pas modifiée par l'Atracurium. La récupération peut être accélérée par l'administration d'anticholinestérasiques associés à l'atropine, dès l'observation des premiers signes de récupération spontanée.

### INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES :

Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours ou récent à votre médecin ou à votre pharmacien.

### INCOMPATIBILITES :

Ne pas mélanger dans la même seringue la solution d'Atracurium au thiopental ou à tout autre produit alcalin.

**CONDITIONS DE DELIVRANCE :** Liste I, tableau A, réservé à l'usage hospitalier.

### CONDITIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION :

Atracurium 25<sup>®</sup> et Atracurium 50<sup>®</sup> doivent être conservés à une température comprise entre 2 et 8 °C (au réfrigérateur) et à l'abri de la lumière.

**NE PAS CONGELER.**

### PRESENTATIONS ET NUMEROS D'AMM :

Spécialités	Présentations	N° AMM
ATRACURIUM 25	Boîte de 50 flacons de 2,5 ml	923 340 1H
ATRACURIUM 50	Boîte de 50 flacons de 5 ml	923 340 2H
ATRACURIUM 25	Boîte de 10 flacons de 2,5 ml	923 340 3H
ATRACURIUM 50	Boîte de 10 flacons de 5 ml	923 340 4H

**DATE DE LA DERNIÈRE RÉVISION :** Février 2012

**Ceci est un médicament.**

- Un médicament est un produit mais pas comme les autres.
- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non-conforme aux prescriptions vous expose à un danger.
- Respectez rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous a prescrit, suivez les conseils de votre pharmacien.
- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament, ses indications et ses contre-indications.
- N'arrêtez pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite.
- N'en reprenez pas, n'augmentez pas les doses sans consulter votre médecin.

**Gardez les médicaments hors de portée des enfants**