



A partir du 6ème mois de grossesse, vous ne devez en aucun cas prendre de vous-même ce médicament, car ses effets sur votre enfant peuvent avoir des conséquences graves, notamment sur un plan cardiopulmonaire et rénal, et cela même avec une seule prise.

Il peut arriver toutefois, dans des cas très particuliers que votre gynécologue vous prescrive ce médicament.
DEMANDEZ CONSEIL A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE TOUT MEDICAMENT

Allaitement :

Ce médicament passe dans le lait maternel. Par mesure de précaution, il convient d'éviter de l'utiliser pendant l'allaitement.

D'UNE FACON GENERALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MEDICAMENT

CONDUCTEURS ET UTILISATEURS DE MACHINES

Dans de rares cas, la prise de ce médicament peut entraîner des vertiges, une somnolence, des troubles de la vue.

4- COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT

Posologie

- Traitement d'attaque : 1 suppositoire le soir en complément des formes orales.
- Traitement d'entretien : 1 suppositoire par jour.

Mode et voie d'administration :

Voie rectale.

Le choix de la voie rectale n'est déterminé que par la commodité d'administration du médicament.

Durée du traitement :

L'utilisation de la voie rectale doit être la plus courte possible en raison du risque de toxicité locale surajoutée aux risques par voie orale

5- EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

Effets indésirables

COMME TOUT MEDICAMENT, CE PRODUIT PEUT CHEZ CERTAINES PERSONNES ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS :

Peuvent survenir :

- des réactions allergiques cutanées (rougeurs, urticaire, démangeaisons) ; respiratoires (crise d'asthme) ; générales (allergie, inflammation des petits vaisseaux (vascularités), brusque gonflement du visage et du cou (d'origine allergique) avec éventuelle gêne respiratoire (œdème de Quincke),
- rarement : décollement de la peau pouvant rapidement s'étendre de façon très grave à tout le corps
- exceptionnellement, jaunisse.

Il faut **immédiatement arrêter le traitement et avertir votre médecin.**

- Dans certains cas rares, il est possible que survienne une hémorragie digestive (rejet de sang par la bouche ou dans les selles, coloration des selles en noir). Celle-ci est d'autant plus fréquente que la posologie utilisée est élevée.

Il faut **immédiatement arrêter le traitement et avertir votre médecin.**

- au cours du traitement, il est possible que surviennent :

- des troubles digestifs : maux d'estomac, nausées, vomissements, ballonnements,
- des maux de tête, vertiges, insomnies, bourdonnements d'oreille, troubles de l'audition, de la vision ou de la concentration, œdème.

Il faut **en avertir votre médecin.**

- En cas d'intolérance rectale.

- Des cas d'ulcère ou de perforation gastro-intestinale, d'inflammation de la bouche avec ulcération (stomatite ulcéreuse), d'infection pulmonaire, de méningite, de maladie de reins, d'hépatite sévère ont pu être observés.

- Quelques modifications biologiques peuvent nécessiter éventuellement un contrôle des bilans sanguin, hépatique et rénal.

NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN ET A SIGNALER TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE

6 - CONSERVATION

NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR

PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION

A conserver à l'abri de la chaleur

CECI EST UN MEDICAMENT

- Un médicament est un produit, mais non comme les autres.
- un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux prescriptions vous expose à un danger.
- Suivez les conseils de votre pharmacien.
- Ne le reprenez pas, n'en augmentez pas les doses sans consulter votre médecin.

Ne laissez jamais les médicaments à portée des mains des enfants

FAP125/00



Fabriqué par les Laboratoires **TERIAK**
 CHEYLUS 1111 ZAGHOUAN

Apranax® 500 mg

Naproxène

Suppositoires

1/ IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

Composition

Principe actif :

Naproxène500 mg

Excipients : Glycérides hémysynthétique solidesq.s.p un suppositoire

Forme pharmaceutique

Suppositoires, boîte de 12

Classe pharmaco-thérapeutique

ANTI-INFLAMMATOIRE NON STEROIDIEN

(M : système locomoteur)

2- DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Indications thérapeutiques

Ce médicament est indiqué, chez l'adulte et l'enfant à partir de 15 ans, au :

- Traitement symptomatique des maladies rhumatismales et chroniques
- Polyarthrite rhumatoïde aiguë
- Ostéo-arthrite aiguë
- Spondylarthrite ankylosante.

3- ATTENTION !

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament **NE DOIT PAS ETRE UTILISE** dans les cas suivants :

- à partir du 6ème mois de grossesse
- antécédent d'allergie ou d'asthme déclenché par la prise de ce médicament ou d'un médicament apparent, notamment autres anti-inflammatoires non stéroïdiens, aspirine,
- antécédent d'allergie à l'un des constituants du produit,
- ulcère de l'estomac ou du duodénum en évolution,
- insuffisance hépato-cellulaire sévère,
- insuffisance rénale sévère,
- insuffisance cardiaque sévère non contrôlée,
- antécédents récents de recitites ou de rectorragies,
- enfant de moins de 15 ans.

Ce médicament **ne doit généralement pas être utilisé**, sauf avis de votre médecin, en association avec les :

- anticoagulants oraux,
- autres anti-inflammatoires non stéroïdiens (y compris les salicylés à fortes doses),
- héparine injectable
- lithium
- méthotrexate (utilisé à des doses supérieures à 15 mg par semaine)
- ticlopidine

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MISES EN GARDE SPECIALES

Ce médicament ne doit être pris que sous surveillance médicale.

Prévenir votre médecin :

- en cas d'antécédent d'asthme associé à une rhinite chronique, une sinusite chronique ou des polypes dans le nez.
- L'administration de ce médicament peut entraîner une crise d'asthme.
- en cas de traitement anticoagulant ou anti-agrégant plaquettaire concomitant. Ce médicament peut entraîner des manifestations gastro-intestinales graves (hémorragies, ulcères)
- En cas d'infection, la surveillance devra être renforcée.

Interrompre immédiatement le traitement en cas d'hémorragie gastro-intestinale.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

En raison de la nécessité d'adapter le traitement, il est important de prévenir le médecin qui rédige l'ordonnance en cas :

- d'antécédents digestifs (hémorragie digestive, hernie hiatale, ulcère de l'estomac ou du duodénum anciens),
- de maladie du cœur, du foie ou du rein,
- d'asthme : la survenue de crise d'asthme chez certains patients peut être liée à une allergie à l'aspirine ou à un anti-inflammatoire non stéroïdien

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, notamment les anticoagulants oraux, les autres anti-inflammatoires non stéroïdiens y compris l'aspirine et ses dérivés à fortes doses, l'héparine injectable, le lithium, le méthotrexate à fortes doses (supérieures à 15 mg par semaine) et la ticlopidine, il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.

GROSSESSE - ALLAITEMENT

Grossesse :

Au cours des 5 premiers mois, de votre grossesse, votre médecin peut être amené, **si nécessaire**, à vous prescrire ce médicament.