

DESLOR® 5 mg

DCI : Deslorratadine

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice:

1. Qu'est-ce que Deslor et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Deslor ?
3. Comment utiliser Deslor ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Deslor ?
6. Informations supplémentaires ?

1. QU'EST-CE QUE DESLOR ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Deslor est un antihistaminique anti-H1 ; il contient un médicament appelé « desloratadine ». Il est utilisé contre l'allergie. Il ne vous rend pas somnolent. Il aide à contrôler votre réaction allergique et ses symptômes.

Deslor est indiqué dans :

- La Rhinite Allergique ;
- L'Urticaire Chronique Idiopathique.

La desloratadine soulage les symptômes associés à la rhinite allergique (inflammation nasale provoquée par une allergie, par exemple, le rhume des foins ou l'allergie aux acariens). Ces symptômes comprennent les éternuements, le nez qui coule ou qui démange, les démangeaisons du palais, les yeux qui démangent, qui sont rouges ou larmoyants. Elle est également utilisée pour soulager les symptômes associés à l'urticaire (atteinte cutanée provoquée par une allergie). Ces symptômes comprennent les démangeaisons et éruptions urticariennes. Le soulagement de ces symptômes dure toute la journée et vous aide à poursuivre vos activités quotidiennes normales et préserve votre sommeil.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE DESLOR ?

N'utiliser jamais Deslor

Si vous êtes allergique (hypersensible) à la desloratadine, à l'un des autres composants contenus dans Deslor, ou à la loratadine.

Faites attention avec Deslor :

Si vous présentez une maladie des reins.

En cas de doute, n'hésitez pas de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant de prendre Deslor.

Prise d'autres médicaments :

Il n'y a pas d'interactions connues entre la Desloratadine et les autres médicaments.

Aliments et boissons :

Deslor peut être pris pendant ou en dehors des repas.

Grossesse et allaitement :

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament durant votre grossesse et si vous allaitez.

Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, l'utilisation de la desloratadine n'est pas recommandée.

Conduite de véhicules et utilisation de machines :

A la dose recommandée, la desloratadine ne rend généralement pas somnolent et ne diminue pas la vigilance.

Cependant, très rarement ont été rapportés des cas de somnolence susceptible d'affecter l'aptitude à conduire ou à utiliser des machines.

3. COMMENT UTILISER DESLOR ?

Deslor est indiqué chez l'adulte et l'adolescent (12 ans et plus) à raison de un comprimé une fois par jour à prendre au moment ou en dehors des repas.

Concernant la durée du traitement, votre médecin déterminera le type de rhinite allergique dont vous souffrez et déterminera la durée pendant laquelle vous devrez prendre Deslor.

Si votre rhinite allergique est intermittente (présence de symptômes sur une période de moins de 4 jours par semaine ou sur une période inférieure à 4 semaines), votre médecin vous recommandera ce traitement pour une durée qui dépendra de l'évaluation des antécédents de votre maladie.

Si votre rhinite allergique est persistante (présence de symptômes sur une période de 4 jours ou plus par semaine et pendant plus de 4 semaines), votre médecin peut vous recommander ce traitement pour une durée plus longue.

Concernant l'urticaire, la durée de traitement peut être variable d'un patient à l'autre et vous devez donc suivre les instructions de votre médecin

Si vous avez pris plus de Deslor que vous n'auriez dû

Prenez Deslor uniquement comme il vous a été prescrit. Aucun problème sérieux n'est attendu lors d'un surdosage accidentel. Cependant, si vous avez pris plus de Deslor que vous n'auriez dû, prévenez votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre Deslor

Si vous avez oublié de prendre votre dose à temps, prenez-la dès que possible, puis continuez votre traitement normalement.

Ne prenez jamais de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, la desloratadine peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde. Chez l'adulte, les effets indésirables sont à peu près les mêmes que ceux observés avec un comprimé placebo. Cependant, la fatigue, la sécheresse de la bouche et le mal de tête ont été rapportés plus souvent qu'avec un comprimé placebo. Chez les adolescents, le mal de tête était l'effet indésirable le plus fréquemment rapporté. Depuis la commercialisation de la desloratadine, des cas de réactions allergiques sévères (avec gêne respiratoire, sifflements bronchiques, démangeaisons, plaques d'urticaire et gonflements) et d'éruption cutanée ont été très rarement rapportés. Des cas de palpitations, d'accélération du rythme cardiaque, de douleur d'estomac, de nausées (envie de vomir), de vomissements, de pesanteur d'estomac, de diarrhées, vertige, somnolence, insomnie, douleur musculaire, d'hallucinations, de convulsions, d'agitation avec mouvements corporels augmentés, inflammation du foie et d'anomalies du bilan hépatique sanguin ont aussi été très rarement rapportés.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER Deslor ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

A conserver à une température ne dépassant pas 30°C.

A conserver dans l'emballage extérieur d'origine.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient Deslor :

	DESLOR 5 mg
Principe actif : Desloratadine	5 mg
Liste des excipients :	Dihydrogénophosphate de calcium, Cellulose microcristalline, Amidon prégelatinisé, Stearate de magnésium et Opadry II bleu q.s.

Qu'est-ce que Deslor et contenu de l'emballage extérieur

DESLOR 5 mg : DCI : Desloratadine – boîtes de 07, 15 et de 30 comprimés pelliculés sous plaquette thermoformée.

Conditions de délivrance :

Liste II. Uniquement sur prescription médicale.

Présentations :

Spécialités	Présentations	AMM N°
DESLOR 5 mg	Boîte de 07 comprimés	923 336 4
DESLOR 5 mg	Boîte de 15 comprimés	923 336 2
DESLOR 5 mg	Boîte de 30 comprimés	923 336 3

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché et fabricant

Les Laboratoires des Médicaments Stériles - S.A.

Route de Nabeul - KM 7 - BP 206 8000 Nabeul - Tunisie

Tel : (216) 72 23 50 06 ; Fax: (216) 72 23 50 16

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée : Août 2013

Ceci est un médicament.

- Le médicament est un produit qui affecte votre santé et sa consommation contraire aux instructions est dangereuse pour vous.
- Suivez strictement la prescription du médecin, la méthode d'utilisation et les instructions du pharmacien qui vous a dispensé le médicament.
- Le médecin et le pharmacien sont experts en médicaments, ses bienfaits et ses risques.
- N'interrompez pas de vous-même la période du traitement qui vous a été prescrit.
- Ne répétez pas la même prescription sans consulter votre médecin.

Gardez les médicaments hors de portée des enfants