

LRJ®

Phéniramine - Tétrazoline

FORME PHARMACEUTIQUE :

Flacon compte-gouttes de 10 ml.

COMPOSITION :

| | |
|---|-------|
| Phéniramine maléate | 30 mg |
| Tétrazoline chlorhydrate | 5 mg |
| Thiomersal | 1 mg |
| Excipients. qsp. | |
| Eau pour préparation injectable q.s.p | 10 ml |

PROPRIETES PHARMACEUTIQUE :

- Décongestionnant des muqueuses oculaires et vasoconstricteur.
- LRJ est une association d'un produit vasoconstricteur (Tétrazoline) ayant une activité alpha stimulante et d'un produit ayant une activité anti-histaminique (phéniramine) qui bloque les récepteurs H1.

INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

Irritations et congestions de la conjonctive, conjonctivite d'origine toxique et allergique à évolution subaiguë et chronique.

CONTRE-INDICATIONS :

- Glaucome par fermeture de l'angle.
- Hypersensibilité à l'un des composants du produit.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Il est déconseillé de l'utiliser chez les enfants de moins de trois ans .
- Eviter les instillations répétées et/ou de façon prolongée chez les sujets atteints d'hypertension artérielle, de maladie cardio-vasculaire, d'hyperthyroïdie, d'arythmie et chez les diabétiques.
- Eviter l'association avec les IMAO.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

Pas de contre indications.

EFFETS INDESIRABLES :

- Possibilité de mydriase gênante, d'augmentation de la pression intraoculaire.
- Effet systémique collatéral non constaté à dose habituelle.

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE :

- En moyenne : 2 instillations, 4 fois par jour durant 7 à 10 jours.

DUREE D'UTILISATION :

15 jours après ouverture du flacon.

CONSERVATION :

- Reboucher le flacon après usage.
- A conserver à l'abri de la lumière et de la chaleur.

PRESENTATION :

Boîte de 1 flacon de 10 ml . A.M.M : 923 319 1

Ceci est un médicament.

- Le médicament est un produit qui affecte votre santé et sa consommation contraire aux instructions est dangereuse pour vous.
- Suivez strictement la prescription du médecin, la méthode d'utilisation et les instructions du pharmacien qui vous a dispensé le médicament.
- Le médecin et le pharmacien sont experts en médicaments, ses bienfaits et ses risques.
- N'interrompez pas de vous-même la période du traitement qui vous a été prescrit.
- Ne répétez pas la même prescription sans consulter votre médecin.

Gardez les médicaments hors de portée des enfants

إن هذا دواء

- الدواء مستحضر ولكن ليس كغيره من المستحضرات
- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافا للتعليمات يعرضك للخطر.
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها.
- تقيّد بتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك، فالطبيب و الصيدلاني هما الخبيران بالدواء وبنفعه وضرره
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تعدّ ولا تزدعليها بدون استشارة الطبيب.

لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال.

Les Laboratoires Médis - S.A.
Route de Nabeul - km 7 - BP 206 - 8000 Nabeul - Tunisie
Tél.: (216) 72 235 006 - Fax : (216) 72 235 016

Médis

Code N00011
V03