MP 20[®] – MP 40[®] – MP 500[®] Méthylprednisolone

FORMES ET PRESENTATIONS :

MP 20

Pour un flacon de lyophilisat :

Méthylprednisolone (sous forme de succinate sodique) 20 mg

Excipients : Phosphate monosodique dihydraté, Phosphate disodique dodécahydraté, Lactose.

Pour une ampoule de solvant :

E.P.P.I q.s.p 2 ml

MP40

Pour un flacon de lyophilisat :

Méthylprednisolone (sous forme de succinate sodique) 40 mg

Excipients : Phosphate monosodique dihydraté, Phosphate disodique dodécahydraté, Lactose.

Pour une ampoule de solvant :

E.P.P.I q.s.p 2 ml

MP 500

Pour un flacon de lyophilisat :

Méthylprednisolone (sous forme de succinate sodique) 500 mg

Excipients : Phosphate monosodique dihydraté, Phosphate disodique dodécahydraté.

INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

Le méthylprednisolone est un corticoïde de synthèse d'action rapide, utilisable par voie systémique.

Le méthylprednisolone est utilisé principalement pour ses effets anti-inflammatoire et antiallergique, diminuant la réponse immunitaire à forte dose :

- Réactions allergiques sévères : urticaire, œdème de Quincke, choc anaphylactique.

- Réactions inflammatoires sévères : œdème laryngé, laryngite et épiglottite aiguë, œdème pulmonaire infectieux ou toxique, œdème cérébral, méningite tuberculeuse avec blocage du LCR. Péricardite, uvéites graves, surdité brusque, paralysie faciale à frigorie, otite sévère.

- Affections pulmonaires : asthme grave, sarcoïdose, fibrose pulmonaire, poussée aiguë d'une insuffisance respiratoire chronique.

- Maladies auto-immunes : anémie hémolytique auto-immune, purpura thrombopénique idiopathique, lupus érythémateux disséminé, dermatopolymyosite, polymyosite, fasciite à éosinophile, périarthrite noueuse, sclérodermie, pemphigus, pemphigoïde bulleuse, thyroïdite, hépatite chronique active, polyarthrite rhumatoïde, myasthénie.

- Diverses : rhumatisme articulaire aiguë, syndrome néphrotique, exophtalmie maligne, leucémies, syndromes myéloprolifératifs, néoplasies, sclérose en plaque, certaines névrites optiques, poussée évolutives des colites inflammatoires, transplantation d'organe.

CONTRE INDICATIONS :

Aucune contre-indication absolue pour une corticothérapie brève ou d'indication vitale.

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants : maladies virales en évolution (zona et herpes, hépatite virale aiguë), infection ou mycose non contrôlées par un traitement adapté, goutte, cirrhose alcoolique grave, psychose, ulcère de l'estomac ou du duodénum en poussée.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION :

- La solution obtenue en mélangeant le flacon et l'ampoule doit être utilisée immédiatement. Elle ne doit pas être conservée en vue d'injections multiples.

- La solution obtenue peut être administrée par voie IM profonde, par voie IV lente ou par perfusion IV après dilution dans une solution injectable isotonique de chlorure de sodium ou de glucose.

- La posologie doit être adaptée à chaque malade en fonction du diagnostic du médecin.

- Généralement, MP 500 est réservé aux cas nécessitant une Corticothérapie à forte dose. Elle n'est alors utilisée que par voie IV ou en perfusion.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Utiliser avec prudence chez l'enfant, la femme ménopausée, en cas d'antécédents ulcéreux, d'antécédents psychiatrique, d'HTA, de diabète, d'ostéoporose, de colite ulcéreuse, d'épilepsie..

- Traiter toute infection pouvant être favorisée par la corticothérapie.

- Il est conseillé de diminuer, voir de supprimer l'apport de sel dans l'alimentation et de suivre un régime riche en protéine, et calcium et pauvre en glucose.

- Surveillance des malades sous corticothérapie : tolérance clinique, poids, TA, kaliémie, glycémie.

- La corticothérapie, surtout au long court entraîne une inertie de l'axe hypophyso – surrénalien. Le traitement ne doit donc pas être arrêté brutalement sous peine de voir apparaître une insuffisance surrénalienne aiguë.

Grossesse : risque d'insuffisance surrénalienne néonatale chez l'enfant, et risque de diabète, d'hypertension artérielle et de prise de poids excessive chez la mère.

Allaitement : à éviter (passage dans le lait maternel).

Sportifs : Cette spécialité contient un principe actif pouvant induire une réaction positive des tests pratiqués lors des tests de contrôle antidopage.

EFFETS INDESIRABLES :

- Des cas d'arythmies et/ ou d'arrêt cardiaque en cas d'administration trop rapide par voie IV de doses importantes ont été rapportés. Des épisodes de tachycardies ou de bradycardies ont été aussi rapportés après l'injection de fortes doses par voie IV.

- En cas de traitement prolongé et à forte dose, les corticoïdes peuvent entraîner chez certaines personnes des effets plus ou moins gênants : troubles métaboliques (rétention hydrosodée avec prise de poids, hypokaliémie, effet orexigène et diabétogène, faiblesse musculaire, amyotrophie, ostéoporose, retard de cicatrisation, arrêt de croissance chez l'enfant) ; troubles digestifs ; troubles psychique; réveil des infections (tuberculose, virose, mycose, et parfois bactérienne)

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES :

- Association contre-indiquées : vaccins à virus vivant

- Associations à surveiller : médicaments hypokaliémisants (amphotéricine B, diurétiques, laxatifs) ou responsable de torsade de pointe (amiodarone, quinine, sotalol, bépridil) ; antidiabétiques, antihypertenseurs, AINS, anticoagulants, digitaliques, ciclosporine, hormone de croissance, interféron alpha.

PRESENTATIONS :

Liste I

MP 20 : boîte de 1 flacon de lyophilisat + 1 ampoule de solvant de 2 ml.

AMM : 923 323 2.

MP 40 : boîte de 1 flacon de lyophilisat + 1 ampoule de solvant de 2 ml.

AMM : 923 323 1.

MP 500 : boîte de 10 flacons de lyophilisat AMM : 923 323 4H.

MP 500 : boîte de 1 flacon de lyophilisat + 1 ampoule de solvant de 2 ml.

AMM : 923 323 3.

Ceci est un médicament.

- Le médicament est un produit qui affecte votre santé et sa consommation contraire aux instructions est dangereuse pour vous.
- Suivez strictement la prescription du médecin, la méthode d'utilisation et les instructions du pharmacien qui vous a dispensé le médicament.
- Le médecin et le pharmacien sont experts en médicaments, ses bienfaits et ses risques.
- N'interrompez pas de vous-même la période du traitement qui vous a été prescrit.
- Ne répétez pas la même prescription sans consulter votre médecin.

Gardez les médicaments hors de portée des enfants

إن هذا دواء

- الدواء مستحضر ولكن ليس كغيره من المستحضرات
- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافا للتعليمات يعرضك للخطر.
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها.
- تقيد بتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك، فالطبيب و الصيدلاني هما الخبيران بالدواء وينفعه وضرره
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تعد ولا تزد عليها بدون استشارة الطبيب.

لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال.