

Héparine MédiS®

Héparine

FORME PHARMACEUTIQUE :

Solution injectable, flacon de 5 ml.

COMPOSITION :

Héparine sodique 25000 UI
Chlorocrésol..... 4 mg
Eau pour préparations injectables. q.s.p 5 ml

INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

- Traitements des thromboses veineuses, de l'embolie pulmonaire, des thromboses artérielles et de toutes les autres manifestations thrombo-emboliques.

- Prévention des accidents thrombo-emboliques veineux et artériels.

- Héparinisation du sang en circulation extracorporelle (Dialyse, chirurgie à cœur ouvert).

CONTRE – INDICATIONS :

- Hypersensibilité à l'héparine ou à une des substances apparentées.

- Hypersensibilité à l'un des composants.

- Manifestations ou tendances hémorragiques liées à des troubles de l'hémostase : hémophilie, purpura, ictère, hépatite grave, thrombocytopenies.

- Lésions organiques hémorragiques.

- Endocardite infectieuse aiguë en-dehors de celles survenant sur prothèse mécanique.

- Période post-opératoire après chirurgie du cerveau et de la moelle épinière.

- Accident vasculaire cérébral hémorragique.

- Hypertension artérielle non contrôlée.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Pratiquez une numération plaquettaire avant traitement puis une à deux fois / semaine arrêt impératif de l'héparinothérapie quand il apparaît une thrombopénie.

- Prudence en cas d'insuffisance hépatique, rénale, d'hypertension artérielle, d'antécédents d'ulcères digestifs ou lésions organiques hémorragiques, ou de maladies vasculaires de la chorio-rétine.

Grossesse :

- L'héparine ne traverse pas le placenta. Elle peut être utilisée tout au long de la grossesse.

- Une prudence particulière s'impose à l'approche de l'accouchement vu le risque hémorragique.

Allaitement :

L'héparine ne passe pas dans le lait maternel.

EFFETS INDESIRABLES :

- Manifestations hémorragiques.

- Thrombopénies graves, d'origine immunoallergique imposant l'arrêt immédiat de l'héparine.

- Rares manifestations allergiques cutanées ou générales.

- Rares observations de nécrose cutanée au point d'injection.

- Petits hématomes au point d'injection qui disparaissent spontanément.

- Ostéoporose lors de traitements prolongés à posologie élevée.

- Elévation des transaminases, hyperéosinophilie.

- Rares manifestations : alopecie, priapisme, hypoaldostéronisme avec hyper kaliémie et/ou acidose métabolique chez les patients à risque.

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE :

- Traitement curatif est de 400 à 600 UI / Kg / 24 h en perfusion continue à la seringue électrique ou défaut en injection I.V. toute les deux heures.

- Traitement réduit de moitié chez les sujets âgées.

- Surveillance du traitement : la dose sera adaptée en cas de traitement curatif par la mesure de la coagulation globale : Temps de céphaline activé : 2 à 3 fois le témoin.

- Traitement préventif : 100UI/kg/24h en perfusion continue à la seringue électrique ou à défaut en injection I.V. toutes les 2 heures.

- Sureveillance du traitement : La dose sera adaptée en cas de traitement préventif par la mesure de la coagulation globale : temps de céphaline activé : 1 à une fois et demie le témoin.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES :

Associations déconseillées :

- Acide acétyl salicyclique et autres produits salicylés.

- A.I.N.S (voie générale).

- Ticlopidine.

A surveiller :

Association avec des anticoagulants oraux, des corticoïdes, Dextran 40 vu le risque hémorragique.

SURDOSAGE

- Le risque hémorragique est partiel au niveau de l'hypo-coagulabilité.

- En cas d'accident hémorragique et en urgence, administrer 1 mg de sulfate de protamine pour neutraliser 100 UI d'héparine environ.

CONSERVATION

A conserver à l'abri de la lumière et de la chaleur.

CONDITIONS DE DELIVRANCE

Liste I (Tableau A)

Sous ordonnance médicale.

PRESENTATION

Hôpital : Boite de 10 flacons

A. M. M : 923 318 1 H

Ceci est un médicament.

- Le médicament est un produit qui affecte votre santé et sa consommation contraire aux instructions est dangereuse pour vous.

- Suivez strictement la prescription du médecin, la méthode d'utilisation et les instructions du pharmacien qui vous a dispensé le médicament.

- Le médecin et le pharmacien sont experts en médicaments, ses bienfaits et ses risques.

- N'interrompez pas de vous-même la période du traitement qui vous a été prescrit.

- Ne répétez pas la même prescription sans consulter votre médecin.

Gardez les médicaments hors de portée des enfants

إن هذا دواء

- الدواء مستحضر ولكن ليس كغيره من المستحضرات
- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافا للتعليمات يعرضك للخطر.
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها.
- تقيد بتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك. فالطبيب والصيدلاني هما الخبيران بالدواء وينفعه وضرره.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تعد، ولا تزد عليها بدون استشارة الطبيب.

لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال.