

SERVAL 100 mg

DCI : Sertraline chlorhydrate

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire
- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que SERVAL 100 mg et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser SERVAL 100 mg ?
3. Comment utiliser SERVAL 100 mg ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver SERVAL 100 mg ?
6. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE SERVAL 100 mg ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : Le composant actif de SERVAL est la sertraline. La sertraline appartient à un groupe de médicaments appelés Inhibiteurs Sélectifs de la Recapture de la Sérotonine (ISRS) : ces médicaments sont utilisés pour traiter la dépression et/ou des troubles anxieux.

SERVAL 100 mg est indiqué dans :

- Épisodes dépressifs majeurs
- Prévention des récurrences d'épisodes dépressifs majeurs
- Trouble panique, avec ou sans agoraphobie
- Troubles obsessionnels compulsifs (TOC) chez l'adulte ainsi que chez les patients pédiatriques âgés de 6 à 17 ans
- Trouble Anxiété Sociale
- Etat de stress post-traumatique (ESPT).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE SERVAL 100 mg ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament. **Ne prenez jamais Serval 100 mg, gélule, dans les cas suivants :**

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la sertraline ou à l'un des autres composants contenus dans Serval 100 mg
- Si vous prenez ou avez pris des médicaments appelés inhibiteurs de la monoamine oxydase (IMAO), notamment la séléline, le moclobémide) ou des médicaments de type IMAO (par exemple le linérolide)
- Si vous interrompez le traitement par la sertraline, vous devez attendre au moins une semaine avant de commencer un traitement par un IMAO. Après avoir arrêté un traitement par un IMAO, vous devez attendre au moins 2 semaines avant de pouvoir commencer un traitement par la sertraline
- Si vous prenez un médicament appelé pimozide (un médicament antipsychotique).

Faites attention avec Serval 100 mg, gélule

Les médicaments ne conviennent pas toujours à tout le monde. Indiquez à votre médecin avant de prendre Serval 100 mg si vous souffrez ou avez souffert de l'une des affections suivantes :

- Syndrome sérotonnergique. Dans de rares cas, ce syndrome peut survenir lorsque vous prenez certains médicaments en même temps que la sertraline. (Pour les symptômes, veuillez vous reporter à la rubrique 4. «Quels sont les effets indésirables éventuels ? »). Votre médecin vous aura indiqué si vous avez souffert de ce syndrome dans le passé.
- Si votre concentration de sodium sanguin est faible, car cela peut survenir en raison du traitement par Serval 100 mg. Vous devez également informer votre médecin si vous prenez certains médicaments contre l'hypertension artérielle qui peuvent aussi modifier la concentration de sodium sanguin.
- Prenez des précautions particulières si vous êtes âgé car vous pouvez présenter un risque plus élevé de baisse de la concentration de sodium dans le sang (voir ci-dessus).
- Maladie du foie, votre médecin peut décider de vous traiter par une dose plus faible de Serval 100 mg
- Diabète, votre concentration de glucose dans le sang peut être modifiée par Serval 100 mg et votre traitement contre le diabète peut devoir être adapté.
- Epilepsie ou antécédents de crises convulsives. Si vous avez une crise (convulsions), contactez immédiatement votre médecin.
- Si vous avez souffert d'une maladie manaco-dépressive (trouble bipolaire) ou d'une schizophrénie. Si vous avez un épisode de manie, contactez immédiatement votre médecin.
- Si vous avez ou avez eu des pensées suicidaires (voir ci-dessous - pensées suicidaires et aggravation de votre dépression ou de votre anxiété).
- Si vous avez souffert de troubles hémorragiques ou si vous avez pris des médicaments qui fluidifient le sang (par exemple, acide acétylsalicylique (aspirine), ou warfarine) ou qui peuvent augmenter le risque d'hémorragie.
- Si vous êtes un enfant ou un adolescent âgé de moins de 18 ans. Serval 100 mg ne doit être utilisé chez l'enfant et l'adolescent âgé de 6 à 17 ans que s'ils souffrent du trouble obsessionnel compulsif. Si vous êtes traité pour ce trouble, votre médecin mettra en place une surveillance étroite (voir Utilisation chez l'enfant et chez l'adolescent, ci-dessous)
- Si vous recevez une électroconvulsivothérapie (ECT).

Agitation/Akathisie

- L'utilisation de la sertraline a été associée à l'akathisie (une agitation pénible et un besoin impérieux de bouger, avec souvent une incapacité à rester assis ou debout tranquillement). Ces troubles surviennent le plus souvent pendant les premières semaines de traitement. L'augmentation de la dose peut être néfaste aux patients présentant de tels symptômes.

Réactions de sevrage

La survenue de réactions de sevrage est fréquente à l'arrêt du traitement, particulièrement si le traitement est interrompu brutalement (voir rubrique 4 « Quels sont les effets indésirables éventuels ? »). Le risque de symptômes de sevrage dépend de la durée du traitement, de la dose et de la vitesse à laquelle la dose est réduite. Généralement, ces symptômes sont légers à modérés. Ils peuvent cependant être graves chez certains patients. Ils surviennent normalement au cours des premiers jours suivant l'arrêt du traitement. En général, ces symptômes disparaissent spontanément et régressent en 2 semaines. Chez certains patients, ils peuvent durer plus longtemps (2-3 mois ou plus). Lors de l'arrêt du traitement par la sertraline, il est recommandé de réduire la dose progressivement sur une période de plusieurs semaines ou mois, selon les besoins du patient.

Pensées suicidaires et aggravation de votre dépression ou de votre trouble anxieux :

- Vous souffrez de dépression et/ou d'un trouble anxieux, vous pouvez parfois avoir des idées d'auto-agression (agression envers vous-même) ou de suicide. Ces manifestations peuvent être majorées au début d'un traitement par antidépresseur, car ces médicaments demandent tous un certain temps pour agir, généralement près de deux semaines, mais parfois plus longtemps.

Vous êtes davantage susceptible d'avoir ce type de pensées dans les cas suivants :

- Si vous avez déjà eu des idées suicidaires ou d'auto-agression dans le passé.
- Si vous êtes un jeune adulte. Les études cliniques ont montré un risque accru de comportements suicidaires chez l'adulte âgé de moins de 25 ans présentant une maladie psychiatrique et traité par antidépresseur.
- Si vous avez des idées suicidaires ou d'auto-agression à un moment quelconque, contactez immédiatement votre médecin ou rendez-vous directement à l'hôpital.
- Vous pouvez vous faire aider par un ami ou un parent, en lui expliquant que vous êtes dépressif ou que vous souffrez d'un trouble anxieux, et en lui demandant de lire cette notice. Vous pourriez lui demander de vous signaler s'il pense que votre dépression ou votre anxiété s'aggrave, ou s'il s'inquiète d'un changement dans votre comportement.
- **Utilisation chez l'enfant et chez l'adolescent :**
- La sertraline ne doit généralement pas être utilisée chez l'enfant et chez l'adolescent âgé de moins de 18 ans, sauf pour le traitement des troubles obsessionnels compulsifs. Les patients âgés de moins de 18 ans présentent un risque accru d'effets indésirables, notamment de tentatives de suicide, de pensées suicidaires et d'hostilité (en particulier agressivité, comportement d'opposition et colère), lorsqu'ils sont traités par cette classe de médicaments. Néanmoins, il est possible que votre médecin décide de prescrire Serval 100 mg à un patient âgé de moins de 18 ans s'il pense que cela est dans son intérêt. Si votre médecin a prescrit Serval 100 mg à un patient âgé de moins de 18 ans et que vous souhaitez en parler avec lui, veuillez prendre contact avec lui.
- En outre, si l'un quelconque des symptômes indiqués ci-dessus apparaît ou s'aggrave chez un patient âgé de moins de 18 ans traité par Serval 100 mg, vous devez en informer votre médecin.
- Par ailleurs, la sécurité d'emploi à long terme de Serval 100 mg en ce qui concerne la croissance, la maturation et le développement cognitif et comportemental dans cette tranche d'âges n'a pas été démontrée à l'heure actuelle.

Lactose :

En raison de la présence de lactose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de galactosémie, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou d'un déficit en lactase (maladies métaboliques rares).

Prise d'autres médicaments :

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin. Certains médicaments peuvent affecter la manière dont Serval 100 mg agit, ou Serval 100 mg lui-même peut réduire l'efficacité d'autres médicaments administrés en même temps.

Prendre simultanément Serval 100 mg et les médicaments suivants peut entraîner des effets indésirables graves :

- Médicaments appelés inhibiteurs de la monoamine-oxydase (IMAO), comme le moclobémide (utilisé pour traiter la dépression) et la séléline (pour traiter la maladie de Parkinson) et l'antibiotique linérolide. N'utilisez pas simultanément Serval 100 mg et les IMAO
- Médicaments utilisés pour traiter les troubles mentaux (pimozide). N'utilisez pas simultanément Serval 100 mg et le pimozide
- Informez votre médecin si vous avez pris les médicaments suivants :
 - Médicaments phytothérapeutiques contenant du millepertuis (*Hypericum perforatum*). Les effets du millepertuis peuvent durer entre 1 et 2 semaines. Parlez-en avec votre médecin.
 - Produits contenant un acide aminé, le tryptophane.
 - Médicaments destinés à traiter les douleurs sévères (par exemple, tramadol).
 - Médicaments destinés à traiter les migraines (par exemple, sumatriptan).
 - Médicaments empêchant la coagulation du sang (par exemple, warfarine).
 - Médicaments utilisés pour traiter la douleur/l'arthrose (anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), par exemple ibuprofène, acide acétylsalicylique (aspirine))
 - Sédatifs (diazépam).
 - Diurétiques.
 - Médicaments utilisés pour traiter l'épilepsie (phénytoïne)
 - Médicaments utilisés pour traiter le diabète (tolbutamide).
 - Médicaments utilisés pour traiter l'excès d'acidité gastrique et les ulcères gastriques (cimétidine).
 - Médicaments utilisés pour traiter la manie et la dépression (lithium).
 - Autres médicaments utilisés pour traiter la dépression (par exemple, amitriptyline, nortriptyline).
 - Médicaments utilisés pour traiter la schizophrénie et d'autres troubles mentaux (par exemple, perphénazine, lévomépromazine et olanzapine).
- **Aliments et boissons :**
- Les gélules de Serval 100 mg doivent être prises pendant les repas.
- L'alcool doit être évité pendant le traitement par Serval 100 mg
- **Grossesse et allaitement :**
- Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.
- La sécurité d'emploi de la sertraline n'a pas été totalement établie chez la femme enceinte. La sertraline ne doit être administrée à la femme enceinte que si le médecin considère que les bénéfices pour la mère l'emportent sur les risques éventuels pour le fœtus. Les femmes en âge de procréer doivent utiliser une méthode adéquate de contraception si elles sont traitées par la sertraline.
- Il a été mis en évidence que le chlorhydrate de sertraline est excrétée dans le lait maternel. La sertraline ne doit être utilisée chez la femme allaitante que si le médecin considère que les bénéfices pour la mère l'emportent sur les risques éventuels pour le nourisson.
- **Conduite de véhicules et utilisation de machines :**
- Les médicaments psycho-actifs, comme la sertraline, peuvent influencer votre capacité à conduire des véhicules ou à utiliser des machines. Vous ne devez pas conduire ou opérer de machines ou utiliser des machines avant de savoir si ce médicament modifie votre aptitude à effectuer ces tâches.

Informations importantes concernant certains composants de Serval 100 mg, gélule :

Ceci est un médicament.

- Un médicament est un produit mais pas comme les autres.
- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non-conforme aux prescriptions vous expose à un danger.
- Respectez rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous a prescrit, suivez les conseils de votre pharmacien.
- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament, ses indications et ses contre-indications.
- N'arrêtez pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite.
- N'en reprenez pas, n'augmentez pas les doses sans consulter votre médecin.

Gardez les médicaments hors de portée des enfants

Ce médicament contient du lactose.

3. COMMENT UTILISER SERVAL 100 mg ?

Posologie :

Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. Les gélules de SERVAL 100 mg doivent être prises pendant les repas.

Prenez votre médicament une fois par jour, le matin ou le soir.

En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

La dose habituelle est :

• Adultes

Dépression et trouble obsessionnel compulsif.

Dans la dépression et le TOC, la dose efficace habituelle est de 50 mg/jour.

La dose quotidienne peut être augmentée par tranches de 50 mg sur une période de plusieurs semaines. La dose maximale recommandée est de 200 mg/jour.

Trouble panique, trouble anxieux social et état de stress post-traumatique.

Dans le trouble panique, le trouble anxiété sociale et le trouble de stress post-traumatique, le traitement doit être débuté à la dose de 25 mg/jour, qui est augmentée à 50 mg par jour après une semaine.

La dose quotidienne peut ensuite être augmentée par tranches de 50 mg sur une période de plusieurs semaines.

La dose maximale recommandée est de 200 mg/jour.

• Enfants et adolescents :

Serval 100 mg ne doit être utilisé que pour traiter les enfants et les adolescents souffrant de TOC âgés de 6 à 17 ans.

Troubles obsessionnels compulsifs :

- Enfants âgés de 6 à 17 ans : la dose initiale recommandée est de 25 mg une fois par jour. Après une semaine, votre médecin peut augmenter cette dose jusqu'à 50 mg/jour.

La dose maximale est de 200 mg/jour.

- Enfants âgés de 13 à 17 ans : la dose initiale recommandée est de 50 mg/jour.

La dose maximale est de 200 mg/jour.

Si vous souffrez de problèmes de foie ou des reins, veuillez en informer votre médecin et suivre ses instructions.

• Durée du traitement

Votre médecin vous indiquera la durée pendant laquelle vous devez prendre ce médicament. Elle dépendra de la nature de votre maladie et de la manière dont vous répondez au traitement. Plusieurs semaines sont parfois nécessaires pour que vos symptômes commencent à s'améliorer.

Si vous avez utilisé plus de SERVAL 100 mg que vous n'auriez dû :

Contactez votre médecin immédiatement ou rendez-vous au service d'urgences de l'hôpital le plus proche. Prenez toujours avec vous la boîte et la notice de ce médicament, qu'il reste des médicaments ou non. Les symptômes de surdosage peuvent comprendre : somnolence, nausées et vomissements, accélération de la fréquence cardiaque, tremblements, agitation, sensations vertigineuses et dans de rares cas perte de connaissance.

Si vous avez oublié d'utiliser SERVAL 100 mg :

Si vous avez oublié une dose, ne la prenez pas plus tard. Prenez simplement la dose suivante conformément à la prescription. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre.

Si vous arrêtez d'utiliser SERVAL 100 mg :

N'arrêtez pas de prendre SERVAL 100 mg sauf si votre médecin vous l'indique. Votre médecin diminuera progressivement la dose de SERVAL 100 mg sur une période de plusieurs semaines, avant que vous puissiez interrompre ce médicament. Si vous interrompez brutalement la prise de ce médicament, vous pouvez présenter des effets indésirables comme des sensations vertigineuses, un engourdissement, des troubles du sommeil... Si vous présentez l'un quelconque de ces effets indésirables ou tout autre effet indésirable lors de l'interruption du traitement par SERVAL 100 mg, veuillez en informer votre médecin.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, SERVAL 100 mg est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Si vous ressentez comme grave l'un des effets mentionnés ou si vous présentez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Les nausées constituent l'effet indésirable le plus fréquent. Les effets indésirables dépendent de la dose et disparaissent souvent avec la poursuite du traitement.

Avertissez immédiatement votre médecin si vous présentez l'un des symptômes suivants après la prise du médicament, ces symptômes peuvent être graves :

- Si vous développez une éruption cutanée sévère provoquant la formation de cloques (érythème polymorphe), (elle peut affecter la bouche et la langue). Il peut s'agir des signes d'une maladie portant le nom de syndrome de Stevens-Johnson ou d'une nécrolyse épidermique toxique (NET). Dans ce cas, votre médecin interrompra votre traitement.
- Réaction allergique ou allergie, qui peut se manifester par des symptômes comme une éruption cutanée avec démangeaisons, des difficultés respiratoires, une respiration sifflante, un gonflement des paupières, du visage ou des lèvres
- Si vous présentez une agitation, une confusion, une diarrhée, une fièvre et une augmentation de la pression artérielle, une transpiration excessive et une accélération de la fréquence cardiaque. Il s'agit de symptômes caractéristiques du syndrome sérotonnergique. Dans de rares cas, ce syndrome peut survenir lorsque vous prenez certains médicaments en même temps que la sertraline. Votre médecin interrompra probablement votre traitement.
- Si vous avez ou avez eu une coloration jaune, ce qui peut être le signe d'une atteinte du foie.
- Si vous présentez des symptômes dépressifs avec des idées suicidaires
- Si vous commencez à vous sentir agité, et que vous n'êtes pas en mesure de rester assis ou debout tranquillement après avoir commencé à prendre Serval 100 mg. Vous devez dire à votre médecin si vous commencez à vous sentir agité.

Les effets indésirables suivants ont été observés au cours des études cliniques menées chez l'adulte.

Effets indésirables très fréquents (survenus chez plus de 1 patient sur 10) :

Inconscience, sensations vertigineuses, somnolence, maux de tête, diarrhée, nausées, sécheresse buccale, échec à l'éjaculation, fatigue.

Effets indésirables fréquents (survenus chez 1 à 10 patients sur 100) :

Mal de gorge, anorexie, augmentation de l'appétit, dépression, sentiment d'étrangeté, cauchemars, anxiété, agitation nerveuse, diminution de l'intérêt sexuel, goncements de dents, engourdissement et fourmillements, tremblements, tension musculaire, goût anormal, manque d'attention, troubles visuels, bourdonnements d'oreilles, palpitations, bouffées de chaleur, bâillement, douleur abdominale, vomissements, constipation, douleur de l'estomac, gaz, éruption cutanée, augmentation de la transpiration, douleurs musculaires, dysfonctionnement sexuel, trouble de l'érection, douleur thoracique.

Effets indésirables peu fréquents (survenus chez 1 à 10 patients sur 1.000) :

Sensation de froid à la poitrine, écoulement nasal, hallucinations, sensation d'euphorie, laisser-aller, pensées anormales, convulsions, contractions musculaires involontaires, coordination anormale, mouvements incessants, anxiété, diminution de sensibilité, troubles du langage, sensations vertigineuses pendant la station debout, migraines, douleurs articulaires, accélération de la fréquence cardiaque, augmentation de la pression artérielle, bouffées vasomotrices, difficulté respiratoire, possible respiration sifflante, essoufflement, saignement de nez, gêne oropharyngée, difficultés à déglutir, hémorroïdes, augmentation de la salivation, lésion de langue, éruptions, gonflement de l'oeil, taches pourpres sur la peau, chute de cheveux, sueurs froides, sécheresse de la peau, urticaire, ostéoartrite, faiblesse musculaire, mal de dos, contractions musculaires, mictions nocturnes, incapacité à uriner, augmentation de la quantité d'urine, augmentation de la fréquence des mictions, problème pour uriner, hémorragie vaginale, dysfonctionnement sexuel chez la femme, maux de tête, frissons, fièvre, faiblesse, soif, diminution de poids, augmentation de poids.

Effets indésirables rares (survenus chez 1 à 10 patients sur 10.000) :

Problème intestinal, infection auriculaire, cancer, gonflement des ganglions, augmentation du cholestérol, diminution du sucre sanguin, symptômes physiques dus au stress ou aux émotions, dépendance au médicament, troubles psychiatriques, agressivité, peurs, pensées suicidaires, somnambulisme, éjaculation précoce, coma, mouvements anormaux, difficultés à se déplacer, sensations exacerbées, troubles sensoriels, glaucome, problème lacrymal, taches devant les yeux, vision double, douleur oculaire provoquée par la lumière, hémorragie dans l'oeil, dilatation des pupilles, crise cardiaque, ralentissement de la fréquence cardiaque, problème cardiaque, mauvaise circulation dans les bras et les jambes, serrement de gorge, respiration rapide, respiration lente, difficultés à parler, hoquet, sang dans les selles, plaie buccale, ulcération de la langue, trouble dentaire, problème avec la langue, ulcération buccale, atteinte de la fonction hépatique, problème cutané avec cloques, éruption cutanée sur le cuir chevelu, texture anormale des cheveux, odeur anormale de la peau, problème osseux, diminution de la quantité d'urine, incontinence urinaire, retard à la miction, saignement vaginal excessif, sécheresse vaginale, douleur et rougeur du pénis et du prépuce, écoulement génital, érection prolongée, écoulement mammaire, hernie, cicatrice au niveau du site d'injection, diminution de la tolérance au médicament, difficultés à marcher, anomalies des analyses biologiques, sperme anormal, blessure, dilatation des vaisseaux sanguins.

Après la commercialisation de la sertraline, les effets indésirables suivants ont été notifiés :

Diminution des globules blancs, diminution des plaquettes, diminution des hormones thyroïdiennes, problème endocrinien, diminution du sel sanguin, rêves anormaux terrifiants, comportement suicidaire, troubles des mouvements musculaires (notamment agitation, tension musculaire et difficulté à marcher), perte de connaissance, vision anormale, problèmes de saignement (par exemple, saignement de nez, saignement de l'estomac ou sang dans l'urine), pancréatite, problèmes graves au niveau de la fonction hépatique, jaunisse, œdème cutané, réaction cutanée au soleil, démangeaisons, douleurs articulaires, crampes musculaires, augmentation de la taille des seins, irrégularités menstruelles, gonflement des jambes, problèmes de coagulation et réaction allergique sévère.

Effets indésirables observés chez l'enfant et l'adolescent :

Au cours des études cliniques effectuées chez l'enfant et l'adolescent, les effets indésirables ont été d'une manière générale similaires à ceux observés chez l'adulte (voir ci-dessus). Les effets indésirables les plus fréquemment notifiés chez l'enfant et l'adolescent ont été : maux de tête, inconscience, diarrhée et maux de tête.

5. COMMENT CONSERVER SERVAL 100 mg ?

Tenir hors de la portée des enfants.

A conserver à l'abri de l'humidité et à une température ne dépassant pas 30°C.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES :

Que contient SERVAL 100 mg :

	SERVAL 100 mg
Principe actif :	
Sertraline (sous forme de Chlorhydrate de Sertraline)	100 mg (111,92 mg)
Excipients :	
Lactose monohydrate, Amidon de maïs prégelatinisé, Lauryl Sulfate de Sodium, Silice colloïdale anhydre, Stéarate de magnésium q.s.	

Qu'est-ce que SERVAL et contenu de l'emballage extérieur :

- SERVAL 100 mg : Sertraline (sous forme chlorhydrate) 100 mg -
- Boîte de 30 gélules, sous plaquette thermoformée PVC blanc -Aluminium

Conditions de délivrance :

Liste I, médicament soumis à prescription médicale.

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché et fabricant

Titulaire de l'Autorisation de Mise sur le Marché :

Les Laboratoires MEDIS - S.A.

Route de Tunis - KM 7 - BP 206 8000 Nabeul - Tunis

Tel : (216) 72 23 50 06

Fax : (216) 72 23 50 16

Fabricant :

Les Laboratoires MEDIS - S.A.

Route de Tunis - KM 7 - BP 206 8000 Nabeul - Tunis

Tel : (216) 72 23 50 06

Fax : (216) 72 23 50 16

Date de la dernière révision : Janvier 2015